

VevoVitall®

Con VevoVitall® mejoramos el ambiente en la porcicultura

- **Con VevoVitall® puede:**
  - Reducir el pH de la orina
  - Reducir la emisión de amoníaco
  - Mejorar la calidad del aire

- **VevoVitall®:**
  - Alternativa al uso de antibióticos

- **VevoVitall® promueve:**
  - Protección del medio ambiente
  - El bienestar de los animales
  - Mejora las condiciones de trabajo en las instalaciones

¿Qué es VevoVitall® y para que sirve?

- **VevoVitall®** es un ácido benozoico ultra-puro (›99,9%).
- **VevoVitall®** es reconocido como seguro (G.R.A.S.) por la FDA y está autorizado por la Unión Europea para uso en lechones y cerdos en engorda.
- En las dietas de cerdos **VevoVitall®** reduce la emisión de amoníaco en las instalaciones de engorda.
- **VevoVitall®** mantiene el equilibrio de las bacterias intestinales, disminuyendo el riesgo de diarreas.

El uso de VevoVitall® tiene tres impactos inmediatos:
- Efecto positivo sobre el medio ambiente.
- Mejora las condiciones de trabajo.
- Diminuye el riesgo de diarreas y la gravedad de los problemas de neumonía.

El efecto aditivo de estos beneficios repercute en una mejora del crecimiento y en una reducción de la conversión alimenticia de los animales.

Los Efectos de VevoVitall®

SOBRE EL AMBIENTE	EN EL ALIMENTO	EN LOS CERDOS
Reducción del pH de la orina.	Preservándolo.	Actividad anti-microbiana sobre bacterias patógenas
↓ Reducción de la emisión de amoníaco en las instalaciones	↓ Limitando la contaminación.	↓ Reduce la incidencia de enfermedades respiratorias y urinarias
↓ Reducción de la contaminación ambiental. Reducción de riesgos de problemas respiratorios en los animales. Mejora en las condiciones de trabajo.	↓ Alimentos más higiénicos	↓ Equilibrio de la flora intestinal. Excretas más sólidas. Reducción de riesgos de diarrea. Mejor rendimiento zootécnico y económico

Eficacia de VevoVitall® como acidificante en alimentos para lechones.*

Parámetros	TRATAMIENTOS					CV
	1 Acido Fumárico	2 0.25 % VevoVitall®	3 0.50 % VevoVitall®	3 0.75 % VevoVitall®	5 Control	(%)
Consumo, g/día	1.002 b	1.049 ab	1.052 ab	1.009 a	987 c a	7.12
Ganancia, g/día	572 b	605 ab	621 a	635 a	564 b	10.07
Conversión, C/G	1.75 a	1.73 a	1.69 a	1.71 a	1.75 a	9.43

Diferente literal en el mismo renglón indica diferencia p‹0.05
* Gheler, Thais, Universidade de São Paulo, Brasil (2005). Tesis de Maestría. Prueba con lechones hasta 70 días.

Dosis recomendadas

La dosis recomendada es de 5 kg por tonelada de alimento, y esta puede variar hasta 10 kg. por tonelada en función de la carga de amoníaco en las instalaciones.

Aún cuando DSM ha tenido cuidado diligentemente de asegurar que la información que aquí se proporciona sea exacta y actualizada, esto no representa ni da garantía alguna de su exactitud ni su confiabilidad, ni de que dicha información sea completa. Tiene propósitos informativos y está diseñada para ser utilizada sólo de negocio a negocio. Esta información no constituye ni proporciona asesoría científica ni médica, de diagnóstico ni de tratamiento y se distribuye sin garantía de ninguna clase, expresa ni implícita. DSM no se hará responsable en ningún caso por daño alguno que surja de la confianza que el lector deposite en estos materiales ni del uso que haga de ellos. El lector será el único responsable de cualquier interpretación o uso del material aquí contenido. El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso. Por favor, póngase en contacto con el representante de DSM en su localidad para obtener más detalles. Todas las marcas comerciales que aparecen en este folleto son marcas registradas o marcas comerciales de DSM en Holanda y/o en otros países.

© DSM Nutritional Products LTD 2011

DSM Nutritional Products
Tel.: +55 11 3760-6300
america-latina.dnp@dsm.com
www.dsmnutritionalproducts.com

20110903-2